




Odra się rozprzestrzenia

- Odra jest niezwykle zakaźna i może być poważna.
- Należy upewnić się, że nasze dzieci otrzymały dwie szczepionki MMR na czas: pierwszą w wieku 1 roku, a drugą w wieku 3 lat i 4 miesięcy.
- Jeśli nie, to nie jest jeszcze za późno. Należy poprosić lekarza rodzinnego (POZ) o darmową szczepionkę jeśli albo dzieci albo my nie jesteśmy z nią na bieżąco
- W przypadku wystąpienia objawów odry należy pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub zadzwonić na dyżurny numer służby zdrowia NHS 111 w celu uzyskania porady. **NIE WOLNO** chodzić do przychodni lekarza POZ lub oddziałów pogotowia, tak roznosimy chorobę na innych
- Objawy obejmują: wysoką gorączkę; bolące czerwone i łzawiące oczy; kaszel; ból i ogólne złe samopoczucie; plamistą, czerwono-brązową wysypkę, która zwykle pojawia się po wystąpieniu pierwszych objawów.
- Na stronie **nhs.uk** znajdziemy więcej informacji na temat odry

Objawy

Wysypka




Gorączka



Katar



Czerwone oczy



Kaszel

